



SCHEDA STANDARDIZZATA PER REAZIONE A PUNTURA DI IMENOTTERO

Cognome e nome

Data di nascita

Sesso: | M F

Professione indicare: ruolo operativo o SATI

Provenienza indicare sede di appartenenza

Tipo di reazione alle punture

- Reazione locale (edema minore di 10 cm di diametro)
- Reazione locale estesa (edema maggiore di 10 cm di diametro)
- Reazione sistemica di grado I (prurito, orticaria generalizzata, malessere)
- Reazione sistemica di grado II (i precedenti più almeno due dei seguenti: angioedema, vertigini, costrizione toracica, nausea, vomito, diarrea, dolore addominale)
- Reazione sistemica di grado III (i precedenti più almeno due dei seguenti: dispnea con sibili o stridore, secchezza delle fauci, disfagia, disartria, obnubilamento, angoscia con senso di morte imminente)
- Reazione sistemica di grado IV (i precedenti più almeno due dei seguenti: cianosi, ipotensione, collasso, perdita di coscienza, incontinenza sfinterica)
- Reazione insolita (interessamento neurologico centrale o periferico, interessamento renale, ematologico, vascolare, malattia da siero)

Tempo trascorso tra la puntura e la reazione in atto

- fino a 30 minuti
- fino a 60 minuti
- fino a 120 minuti
- oltre 120 minuti

Numero di punture ricevute nella reazione in atto

- una
- 2-3
- 4-5
- più di 5

Numero di punture ricevute in passato

- nessuna
- tra 1 e 5
- tra 6 e 10
- più di 10

Tempo trascorso dall'ultima puntura ricevuta

- meno di tre mesi
- tra 3 e 6 mesi
- tra 6 e 12 mesi
- tra 1 e 3 anni
- tra 4 e 10 anni
- più di 10 anni

Descrizione dell'insetto responsabile

- aveva il corpo coperto da peluria
- era sottile
- ha lasciato il pungiglione nella pelle
- la sua puntura è stata molto dolorosa
- proveniva da un nido posto in basso

- aveva il corpo liscio e a strisce gialle e nere
- era massiccio
- è morto dopo la puntura
- il suo volo era rumoroso
- proveniva da un nido posto in alto

Ambiente e occasione della puntura

- a casa
- mentre stava mangiando
- mentre stava praticando giardinaggio

- all'aperto
- mentre stava praticando sport
- mentre stava lavorando

Tipo di soccorso ricevuto

- Pronto soccorso in ospedale
- Dal medico di famiglia
- Da altro medico
- Da altro operatore sanitario (precisare)
- Si è automedicato
 - Con autoiniettore di adrenalina
 - Con antistaminici
 - Con cortisonici

Malattie concomitanti

- Cardiopatía ischemica
- Cardiopatía ipertensiva
- Insufficienza miocardica
- Asma bronchiale
- BPCO
- Epatopatía cronica
- Artropatía cronica
- Dermopatía cronica
- Rinite allergica
- Nefropatía cronica
- Altro (precisare)

In trattamento farmacologico con

- Beta-bloccanti
- ACE-inibitori
- ACE-antagonisti
- Calcio-antagonisti
- Diuretici
- Digitale
- FANS
- Cortisonici
- Antistaminici
- Antileucotrienici
- Immunoterapia specifica con allergeni inalanti
- Altro (precisare)

APPENDICE

Da compilare a cura dell'allergologo al quale il paziente è stato inviato.

Veleno identificato come responsabile:

- Apis mellifera
- Vespula species
- Polistes species
- Vespa crabro

Immunoterapia specifica

- Praticata
- Non praticata

Se praticata

- Completa protezione dalle punture
- Ulteriori reazioni
- Reazione locale estesa
- Reazione insolita (precisare)
- Reazione sistemica di grado I
- Reazione sistemica di grado II
- Reazione sistemica di grado III
- Reazione sistemica di grado IV